

Instrukcja wyliczania stanów liczebnych stada zwierząt w gospodarstwie rolnym.

1. Obliczanie ilości sztuk przelotowych dla grupy wiekowej (lub użytkowej)

- a) Zwierzęta przebywające w swojej grupie rok lub dłużej:

$$\text{przelotowość} = \frac{1}{2} \times (\text{stan początkowy} + \text{stan końcowy})$$

- b) Zwierzęta przebywające w swojej grupie krócej niż rok:

$$\text{przelotowość} = \text{sprzedaż} + \text{przeklasowanie} + \frac{1}{2} \text{ padnięć i ubojów z konieczności} + \frac{1}{2} \times (\text{stan końcowy} - \text{stan początkowy})$$

2. Obliczanie średnich stanów rocznych

- a) Zwierzęta przebywające w swojej grupie rok lub dłużej:

$$\text{Średni stan roczny} = \text{przelotowość} = \frac{1}{2} \times (\text{stan początkowy} + \text{stan końcowy})$$

- b) Zwierzęta przebywające w swojej grupie krócej niż rok:

Tabela 1. Grupy wiekowe (użytkowe) i okresy ich przebywania w stadzie

| BYDŁO | | ŚWINIE | | OWCE | |
|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Nazwa | Okres przebywania w grupie | Nazwa | Okres przebywania w grupie | Nazwa | Okres przebywania w grupie |
| Krowa | > 12 mies. | Macióra | > 12 mies. | Marki (maciorki) > 1 roku | > 12 mies. |
| Jałówka cielna | 9 mies. | Knur | > 12 mies. | Tryki > 1 roku | > 12 mies. |
| Jałówka 1-1,5 roku | 6 mies. | Loszka hodowlana | 6 - 7 mies. | Jarlaki: - maciorki - tryczki - skopki | 8,5 mies. |
| Jałówka 0,5-1 roku | 6 mies. | Knurek hodowlany | 6 - 7 mies. | Jagnięta | 3,5 mies. |
| Opas (MBO) | 5 – 13 mies.* | Warchlak | do 2 mies. | | |
| Cielę | do 6 mies. | Prosię | do 2 mies. | | |
| Buhaj | > 12 mies. | Tucznik | do 2 mies. | | |

* W zależności od intensywności tuczu, masy końcowej ciała itp.